

附件 2 (略)

附件 3 (略)

附件 4

说明书和标签

一、禽流感 (H5+H7) 三价 DNA 疫苗 (pH5-FJ (H5-Re13) 株+pH5-SX (H5-Re14) 株+pH7-YN (H7-Re4) 株) 说明书和内包装标签

(一) 禽流感 (H5+H7) 三价 DNA 疫苗 (pH5-FJ (H5-Re13) 株+pH5-SX (H5-Re14) 株+pH7-YN (H7-Re4) 株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 禽流感 (H5+H7) 三价 DNA 疫苗 (pH5-FJ (H5-Re13) 株+pH5-SX (H5-Re14) 株+pH7-YN (H7-Re4) 株)

商品名 无

英文名 Avian Influenza (H5+H7) Trivalent DNA Vaccine (pH5-FJ (H5-Re13) Strain + pH5-SX (H5-Re14) Strain+pH7-YN (H7-Re4) Strain)

汉语拼音 Qinliugan (H5+H7) Sanjia DNA Yimiao (pH5-FJ (H5-Re13) Zhu + pH5-SX (H5-Re14) Zhu+pH7-YN (H7-Re4) Zhu)

【主要成分与含量】 每毫升疫苗含 DNA 质粒 pH5-FJ (H5-Re13) +pH5-SX (H5-Re14) +pH7-YN (H7-Re4) 不少于 1mg。

【性状】 无色透明液体。

【作用与用途】 用于预防由 H5 亚型 2.3.4.4h 分支、2.3.4.4b 分支和 H7 亚型禽流感病毒引起的禽流感。加强接种后 7 日产生免疫力，免疫期为 6 个月。

【用法与用量】 在腿部进行肌肉注射接种。腿部注射的部位应在踝关节上部肌肉处，可单个针头在两个点各等量注射一次，也可用三通头连接两个针头一次两点注射。用禽流感 (H5+H7) 三价 DNA 疫苗 (pH5-FJ (H5-Re13) 株+pH5-SX (H5-Re14) 株+pH7-YN (H7-Re4) 株) 稀释液将疫苗稀释至每羽份 0.2ml。10~35 日龄蛋鸡每只 0.2ml，肉鸡每只 0.4ml；36 日龄以上蛋鸡每只 0.4ml，肉鸡每只 0.8ml。首免后 21 日用相同剂量加强免疫一次。

【不良反应】 一般无可见不良反应。

【注意事项】 (1) 保存与运输时应在 2~8℃，避免阳光直射。

(2) 腿部肌肉注射免疫应采用 5 号以下规格针头，以免回针时液体流出。

(3) 疫苗不能与任何消毒剂接触。

(4) 仅用于健康鸡群。

(5) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 (1) 22.5ml (250 羽份) /瓶 (2) 45ml (500 羽份) /瓶 (3) 90ml (1000 羽份) /瓶

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 禽流感 (H5+H7) 三价 DNA 疫苗 (pH5-FJ (H5-Re13) 株+pH5-SX (H5-Re14) 株+pH7-YN (H7-Re4) 株) 内包装标签

禽流感 (H5+H7) 三价 DNA 疫苗 (pH5-FJ (H5-Re13) 株+pH5-SX (H5-Re14) 株+pH7-YN (H7-Re4) 株)

兽用

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 详见说明书。

【用法与用量】 在腿部进行肌肉注射接种。腿部注射的部位应在踝关节上部肌肉处, 可单个针头在两个点各等量注射一次, 也可用三通头连接两个针头一次两点注射。用禽流感 (H5+H7) 三价 DNA 疫苗 (pH5-FJ (H5-Re13) 株+pH5-SX (H5-Re14) 株+pH7-YN (H7-Re4) 株) 稀释液将疫苗稀释至每羽份 0.2ml。10~35 日龄蛋鸡每只 0.2ml, 肉鸡每只 0.4ml; 36 日龄以上蛋鸡每只 0.4ml, 肉鸡每只 0.8ml。首免后 21 日用相同剂量加强免疫一次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、兔出血症病毒杆状病毒载体二价灭活疫苗 (VP60 株+SC 株) 说明书和内包装标签

(一) 兔出血症病毒杆状病毒载体二价灭活疫苗 (VP60 株+SC 株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 兔出血症病毒杆状病毒载体二价灭活疫苗 (VP60 株+SC 株)

商品名 无

英文名 Rabbit Haemorrhagic Disease Baculovirus Vector Bivalent Vaccine, Inactivated (Strain VP60+ Strain SC)

汉语拼音 Tuchuxuezhengbingdu Ganzhuangbingduzaiti Erjia Miehuoyimiao (VP60 Zhu+ SC Zhu)

【主要成分与含量】 含灭活的表达的兔出血症病毒1型VP60蛋白抗原和兔出血症病毒2型VP60蛋白抗原。灭活前兔出血症病毒1型VP60蛋白血凝效价为1:2048, 灭活前兔出血症病毒2型VP60蛋白血凝效价为1:4096。

【性状】 静置后, 上层为澄清液体, 下层有少量沉淀, 振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防兔病毒性出血症1型(兔瘟1型)和兔病毒性出血症2型(兔瘟2型)。接种后14日产生免疫力, 免疫期为6个月。

【用法与用量】 颈部皮下注射。35日龄以上兔, 每只1.0ml; 间隔6个月加强免疫一次, 每只1.0ml。

【不良反应】 无明显不良反应。

【注意事项】 (1) 仅适用于接种健康兔。

(2) 疫苗启封后, 限当日用完。

(3) 切忌冻结, 使用前将疫苗温度恢复至室温, 并充分摇匀。

(4) 注射器具应严格消毒, 接种时应做局部消毒处理。

(5) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 兔出血症病毒杆状病毒载体二价灭活疫苗 (VP60株+SC株) 内包装标签

兽用

兔出血症病毒杆状病毒载体二价灭活疫苗 (VP60株+SC株)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防兔病毒性出血症1型(兔瘟1型)和兔病毒性出血症2型(兔瘟2型)。接种后14日产生免疫力, 免疫期为6个月。

【用法与用量】 颈部皮下注射。35日龄以上兔, 每只1.0ml; 间隔6个月加强免疫一次, 每只1.0ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用